

헌혈 후 생길 수 있는 증상

헌혈후에 대부분의 경우에는 부작용을 보이지 않지만 일부에서는 다음과 같은 채혈부작용이 발생할 수 있습니다.

혈관미주신경반응

긴장, 스트레스로 인해 내장에 분포되어있는 신경이 자극되어 오심, 구토, 현기증 등이 나타날 수 있으나 충분히 휴식하면 예방할 수 있습니다.

피하출혈 및 혈종

헌혈하는 과정에서 혈액이 피부사이에 스며들어 생길 수 있습니다. 충분히 지혈하면 예방할 수 있습니다. (동통, 불편감, 출혈반 등의 증상이 있을 수 있습니다.)

구연산반응

성분헌혈 시 항응고제가 헌혈자에게 주입되어 재채기, 입술떨림, 오심, 구토, 목뒤부분의 추운느낌 등의 증상이 발생할 수 있으나 우유 등 칼슘이 함유된 식품을 섭취하면 예방 할 수 있습니다.

국소 피부반응

소독약이나 일회용 반창고에 의해 채혈부위에 가려움증 등이 생길 수 있습니다.

신경손상

매우 드물지만 헌혈 시 혈관주위의 신경이 손상을 받아 감각이상, 동통, 근력감소 등의 증상이 생길 수 있습니다.

* 계속하여 증상이 사라지지 않으면 헌혈증서 뒤에 표기된 **혈액원(02-586-2415)**으로 연락주십시오.
부작용의 발생을 예방하기 위해 유의사항을 꼭 지켜주세요!